Lamberttraube

Lindonlindo

Vass8R08s191-195



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp632


uluataalaataalaataalaataal

Ramberthaube

Lamberttraube bl. 8 R8 s. 191.195

blene, any pricose rapple un pu Knifferle mais grande graff





Lamberthaube DUSIGNATION : CLOS & PLANCHE Vigueur : L PORT : érig - ½ érig - couché Hillerandage: 0 29.7.86 Date de Véraison : 25.8-86 +1 Date de Maturité : Pourriture : O 16 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - M- P 18 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s17 s26 avec pépins - apyrène s37 s4 0 . JUS : inc. ) - coloré , 85 4

duntanlanti

8 RANG 8 Southe 191195 Designation: Lamberttraube CHARGE: Année : 2517 laraison : 5.9188 Watorité: (A.11.:0 Pour.: 0 TAFPE: G-M-TD-Dim.: 13 L - M - C 77.90eur : 25 20 4 erig - (1/2 érig - couché The state of Année : 7G - G - M - P - Dim.: 17 Gase. - sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COVILIUR : BI - Gr - Rs - Rg - N. 87 WEER : (s)- m - ar - fox - herb. Avec pepins - apyrène JUS : inc. / - coloré 83 15 88 13 85 12

DESIGNATION: Lambertraube EMPLACE: BUT: 8 R8 s. 191-195 Date de la vendance: 16-9.86 (+n)

Fords de la vendange : 5 kg 2 500

Hombre de souches : 2 (3339)

Dat

Date de Dégustation: 5.487

duatealaatiidaatiidaatiid

Pourriture : 10%

OBSERVATIONS: Classe: 2,3

Couleur : B

Juntandanta

Indice réfract. : 20° (M°3)
Andité de noût : 4,59

Pressurage Densité:

Date:6.10

Lise on houteille
Dessid: 993

Dogré alcoolique : 11.8

Acidité du vin :51

ANNEE 1987 NOM Lamberthaube

EMPLACEMENT PRESIDENT

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc		Vé début	raisor mi/v		Maturité
يجا الأحاقية الإياالي	4 5 3 5 3	27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 23.3	31,3 31,3 31,3 31,3 31,3	44542		36 36 36 4,6	6,6	11,6 11,6	27-7	30.7	3.8	1.9
	20		31.3	19	9,5		5.6	M. Milley of Adequate	die	Pout	nu &	rige !

ANNEE 1988

NOM Lawberttiante bl

EMPLACEMENT 8 R? s 191. 195

Juntanilanti

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	4	283	283	13	25	27.5	31.5	3,6	25.7	287	1.8	5.9.88
30.3												
Pourriture: O Port: Milinge Vigueur: 2,5 Parbla may												

ANNEE 1989 NOM Lamberttraube B EMPLACEMENT 8 R8 s 191-195

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		Vé début	raison mi/v	Maturité
	4 4	163 133 163	203 x 203 x (63 x	7 6 8		18.5	24.5	24.5 24.5			
Podrriture: 0' Mill.: 0 Port: Mullege Vigueur: 4											

DESIGNATION : EMPLACEMENT : Lamberttraube el 8 R 8 s - 19 1-195 (5 191)

deeteedantiidantiidadadad

# (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

41 - épanoui ① - moyen ② - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8/cotonneux 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 d'éntièrement bronzé 7 - vert 6) - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7)- en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses Qduveteuses 8) - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 6 - à plages bronzées 6)- entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

- Calvoss

Désignation : Emplacement :

Juntandanti

Lamberttraube elos 8 R 8 s-191-195 (s 191)

ilaataalaataalaataalaataal

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) -46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6)- entièrement bronzé 7 - vert 6)- autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ()duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.)

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9) 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8)- partiellement 9.

## (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo85

Désignation :

Juntandanta

Emplacement :

Lamberttraube els 8 R8 s- 191-195<sub>(191)</sub>

dantadantadantadanladad

## RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré ()- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé ( Mare subcontinues 5 - intermittentes (6.)

: coloré () - vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

#### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Lamberttraube bl. clos 8 R 8 s. 491-195 (1.195)

daataalaamalaamalaalaal

Désignation : Emplacement :

Juntandanta

### FEUILLE ADULTE

### Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranécux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 8 ligation révoluté 4 - tourmenté 5. 35 -

lobes : plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3/moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte () - partiellement rouge (5) - Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -38 -

#### PETIOLE

39 - long ( )- moyen ( )- court 3.

39 - glabre ( - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 totalement 8

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2) - autre 3.

Calvo85

Lamberttraube Désignation : Emplacement: Clos 8 R8 8131-195 (3.195) 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 14x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mî-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5. Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 17 x 17 ). 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ( ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.) 29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore () - coloré 2. 33 - A peau fine 3 / moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 / apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3/ or - . Adicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Juntanlanta

No d'ordre :

Calvo 35

daataahuutuuluutuuluutuul

# Formulaire de description 5/8

(maturité)

Année 1998 Code cepage Code clone Nom cepage: LamberTraube

Juntanlanti

Observateur: Lacombe

Emplacement 8 R 8 S 191-195

dandaalaalaalaalaalaalaalaal

## Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) (5) - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9 oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 3 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9 oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)(3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 **lignification du pédoncule** : base seulement (D- moitié 5 - plus de la moitié 7 oiv 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale (2) oiv 209\* présence d'un aileron : absent 1 - une aile(2)- deux ailes(3 - plus de deux ailes 4

Baie The source (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) \$\infty\$ longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. ojy 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3- large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme 1 - uniforme 3) by 223 forme aplatic 1 - arrondic 2 ) elliptique 3 - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 ylindrique 7 - arquée 8. oiv <u>225 couleur épiderme</u> : vert jaune 1) rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violer 5 - bleu noir 6. oiv 220 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme 2) oiv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3) moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3)- moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9 oiv 229 **ombilic** , peu apparent D- apparent 2. oiv 230\* coloration de la pulpe : non colorée 1/2 coloree 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée (1) - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 torte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse(2.) oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (05-75) 5 élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - élevée 7 - très élevce 9 oiv 236 saveur : aucune T- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbace 4 - goût spécial 5. ory 236\* saveur: aucune D- goût muscat 2 - goût foxe 3 - autre 4 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm)(3)- moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9 oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiy 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3) oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9 5-6 mm oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) très faible (~10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (-65mg) 9 oiv 244 cannetures transversales face dorsale pépins absentes 1) présentes 2

Vassal grappe axe de la rafle : non colore 81/- colore 80.

ENOMINATION: Lamberttraile MPLACEMENT: 3 R 8 1 191. 195 (6.193)

Juntan limba

#### SARMENT DE VIGNE

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striëe (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......g... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (5).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

daataalaalaalaalaalaal

N° d'ordre: Désignation: Lamberthaube Emplacement: 8 R 8 191.195

Juntanlanta

```
Angle des nervures
Sexe
                                    : 7-8-9
L_1/L_2
                                   : (10 - (11)
L2/L
                                   : 12 - (13) - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                 : 17 - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : (21) - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire
                                  : (25) - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
                                    : (267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup.
                                    : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : (271)
                                    : (40) - 41
Dents : forme
                                    : (42) - (43) - 44
Dents (angle)
                                   : 45 - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58-
                                   : 60 - 61 - 62
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>
                                    : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 30